



TARTUFO UNCINATO (*Tuber Aestivum* Vitt. forma *Uncinatum* Montecchi)

Per le sue caratteristiche in comune con lo scorzone veniva considerato una varietà del nero estivo; recentemente, per via molecolare, è stato accertato che si tratta di una specie unica. Tuttavia la legislazione italiana e quella francese considerano *T. Aestivum* e *T. Uncinatum* come due specie distinte per l'esigenza di valorizzare maggiormente quest'ultimo che è decisamente migliore, con profumo più gradevole ed intenso, rispetto al *T. Aestivum*.

✘ Caratteristiche del carpoforo

- Dimensioni: le dimensioni medie sono più piccole dello scorzone;
- Peridio: di colore nero con verruche grossolane ma meno pronunciate rispetto all'estivo;
- Gleba: a completa maturazione assume tonalità più scure rispetto all'estivo;
- Spore: in numero da 1 a 5 per asco, di forma ovoidale o ellittica, di colore ocre e reticolate;
- Odore: a maturazione emana un gradevole profumo, più spiccato rispetto all'estivo e per questo più pregiato;
- Periodo di maturazione: da settembre a dicembre;

✘ Diffusione

Molto sensibile alla siccità estiva, si avvantaggia dei luoghi meno assolati dove l'umidità si conserva meglio come versanti esposti a Nord o anche dove l'altitudine e la copertura della vegetazione assicurano le condizioni necessarie al suo sviluppo. Le zone di produzione sono gli areali delle faggete o delle pinete ad alta quota fino ad oltre 1500 m s.l.m.

✘ Piante Simbionti

Oltre al faggio lo si può ritrovare in associazione con querce, carpini e pini.